



ПтероАквасанПланацид **інструкція**

Дезинфікуючий засіб для акваріума. Допомагає позбавитись планарій та гідри.
Безпечно для рослин та інших мікроорганізмів акваріума, зокрема креветок.
Перед вживанням збовтати.

Присутність в акваріумі планарій та гідри є великою проблемою для багатьох акваріумів.
В першу чергу вони небезпечні для креветок, молюсків, молоді риб та ікри.
Для боротьби з цією проблемою нами пропонується препарат Птеро Аквасан Планацид.

Застосування.

Перед внесенням препарату в акваріум бажано провести підготовку.
За 2-3 дні до внесення потрібно ретельно просифонити ґрунт акваріума, прибрати гниючі залишки листя рослин і підмінити 15-25% води.
Потім внести препарат у вказаному вище дозуванні, з попередньо добре збовтавши. Вносити потрібно рівномірно розподіляючи суспензію по площі акваріума. У дуже важких випадках обробку можна повторити згідно інструкції. При внесенні суспензії можливі невеликі грудочки, які не становлять ніякої небезпеки і через деякий час самі розчиняться. Після курсу лікування (2-4 дні) необхідно провести прибирання акваріума, просифонити ґрунт і замінити 25-30% води. Бажано повторити процедуру через тиждень, для знищення молодих планарій що виклюнулися з яєць.

Увага!

Не застосовувати препарат в акваріумі зі скатами і равликами Theodoxus.
Не рекомендується застосовувати в акваріумах з ніжними видами креветок Caridina і т.п. без належного досвіду користувача.
Засіб повільної дії. Результат настає від 2 до 4 днів.

ПтероАквасанПланацид **инструкция**

Дезинфицирующее средство для аквариума. Помогает избавиться от планарий и гидры.
Безопасно для растений и других микроорганизмов аквариума, в том числе креветок.
Перед употреблением взболтнуть

Присутствие в аквариуме планарий и гидры является большой проблемой для многих аквариумистов. В первую очередь они опасны для креветок, моллюсков, молодых рыб и икры.
Для борьбы с этой проблемой нами предлагается препарат Птеро Аквасан Планацид.

Применение.

Перед внесением препарата в аквариум желательно произвести подготовку.
За 2-3 дня до внесения тщательно просифонить ґрунт аквариума, убрать гниющие остатки листьев растений и подменить 15-25% воды. Затем внести препарат в указанной выше дозировке, предварительно взболтав. Вносить необходимо равномерно распределяя суспензию по площади аквариума.
В очень тяжелых случаях обработку можно повторить согласно инструкции. При внесении суспензии возможны небольшие комочки, которые не представляют никакой опасности и через какое то время сами растворятся. После курса лечения (2-4 дня) необходимо произвести уборку аквариума, просифонить ґрунт и заменить 25-30% воды. Желательно повторить процедуру через неделю для уничтожения молодых планарий выклюнувшихся из яиц.

Внимание!

Не применять препарат в аквариуме со скатами и улитками Theodoxus.
Не рекомендовано применять в аквариумах с нежными видами креветок Caridina и т.п. без надлежащего опыта пользователя.
Средство медленного действия. Результат наступает от 2 до 4 дней.